

Skarv

Phalacrocorax carbo

Hiplingur

Cormorant



Skarven yngler i det østligste Nordamerika og vestlige Grønland, i Europa, Asien, Afrika og Australien. I Nordøstatlantlen yngler underarten *P. c. carbo* (storskarv) på Island, De Britiske Øer og i Norge.

De nordlige skarver overvintrer ikke langt fra ynglekolonierne. På Færøerne er skarv en fåtallig gæst hele året, og den har tidligere ynglet her. Underarten *P. c. sinensis* (mel-

lemskarv) fra Centraleuropa er fundet én gang på Færøerne.

Ingen skarver er ringmærket på Færøerne. En unge mærket 22. juni 1982 i Ytra-Haga-drápsker, Barðastrond, Island blev fundet død 19. februar 1983 i Vestmanna, Streymoy, 879 km østsydøst for mærkningsstedet. Dette er den eneste udenlandske genmelding af en skarv mærket på Island (Petersen 1998).




Fig. 1. Mærknings- og genfindslokalitet for skarv ringmærket i udlandet og genmeldt på Færøerne (n=1). Stiplet linje forbinder mærknings- og genfindssted. Ringing and recovery sites of cormorants ringed abroad and recovered in the Faroes (n=1). The dashed line connects ringing and recovery sites.

English summary

Cormorant has formerly bred in the Faroes. It is now only a rare visitor but can be seen year round. The only recovery is of a chick ringed on 22 June 1982 at Barðastrond, Iceland, and found dead in Vestmanna, Streymoy on 19 February 1983, 879 km ESE of the ringing site. This is the only recovery abroad of a cormorant ringed in Iceland.