

# Småspove

## *Numenius phaeopus*

### Spógvi

### Whimbrel



Småspoven yngler på fjeldheder og i tundraområder på Island og Færøerne, i det nordlige Skotland, i Norge, Nordsverige, Finland og Nordrusland, Alaska og Canada. Den Nordeuropæiske bestand menes primært at overvintrere i Vestafrika. På Færøerne er småspoven en almindelig ynglefugl med en bestand på omkring 2.000 par. Småspoven er også en almindelig trækgæst på Færøerne.

#### Mærknings- og genmeldingsdata

I alt er 350 småspover ringmærket på Færøerne spredt over det meste af ø-gruppen (fig. 2), flest ved Sandvík på Suðuroy (26), Mikladalur, Kalsoy (24), Søltuvík, Sandoy (21) og Akraberg,

Suðuroy (21). 61 fugle er mærket på en ikke nærmere angivet lokalitet. Den første småspove blev mærket på Færøerne i 1924 ved Bøur, Vágur, og flest er mærket i 1990 (26) og 1987 (25) (fig. 4). Fuglene er mærket i perioden 5. juni til 21. august (fig. 3), med kulmination omkring månedsskiftet juni-juli. Blandt aldersbestemte fugle (n=332) er 92% mærket som unger, 2% som ungfugle (1k) og 6% som ældre fugle (2k+).

Otte fugle er genmeldt (2,3%). Alle er mærket på de sydlige øer Suðuroy, Sandoy og Skúvoy, undtagen én som er mærket på Vágur. To fugle er genmeldt uden for Færøerne (fig. 1). Ingen småspover ringmærket i udlandet er genfundet på Færøerne.




Fig. 1. Samtlige genfund af småspove ringmærket på Færøerne (n=8). Stiplede linjer forbinder mærknings- og genfundssted. All recoveries of whimbrels ringed in the Faroes (n=8). Dashed lines connect ringing and recovery sites.

#### Fakta Facts

**Mærkninger** *Birds ringed* 350  
- heraf mærket som unger *Ringed as chicks* 302 (92%)

**Genmeldinger** *Recoveries*  
Antal genmeldinger *No. of recoveries* 8  
- heraf udenfor Færøerne *Recovered abroad* 2  
Antal fugle *No. of individuals* 8  
- heraf mærket som unger *Ringed as chicks* 7 (88%)  
Genmeldingsandel *Proportion recovered* 2,3%  
Mærket i udlandet og genmeldt på Færøerne  
*Ringed abroad, recovered in the Faroes* 0

**Ekstremer** *Extremes*  
Højeste alder *Oldest bird* 10 år 11 mdr.  
Længste afstand *Longest distance*  
Guinea-Bissau *Guinea-Bissau* 5.581 km




Fig. 2. Mærkningslokaliteter for småspove ringmærket på Færøerne (n=289). Ringing sites of whimbrels ringed in the Faroes (n=289).

### Træk, overvintring og spredning

Genmeldinger på Færøerne (6) er fra 18. juni til ultimo august (fig. 3). Tre fugle er genmeldt 1-2 måneder efter mærkningen, alle på mærkningslokaliteten: to andre fugle er genmeldt fem år efter mærkningen, også på mærkningslokaliteten, og én ring er genfundet 14 år efter mærkningen, 50 km nord for mærkningslokaliteten.

To genfund i udlandet gælder formentlig fugle på henholdsvis efterårs- og forårstræk. En unge mærket 23. juni 1994 ved Søltuvík, Sandoy blev skudt 12. september 1996 i Guinea-Bissau, 5.581 km syd for mærkningsstedet. En ynglefugl mærket 16. juni 1994 ved Akraberg, Suðuroy, blev fundet død (uvist hvor længe) 31. maj 2004 ved Fowey, Sydvestengland, 1.237 km syd for mærkningsstedet.

Færøske ynglefugle overvintrer formentlig i Vestafrika som skotske og islandske fugle (Cramp & Simmons 1983, Wernham m.fl. 2002). Tilsyneladende vender ynglefuglene tilbage til samme ynglelokalitet år efter år.

### Genmeldings- og dødsårsager

Genmeldingsårsagerne er fordelt med én aflæst fugl og syv døde, hvoraf én skudt og fem fundet. Fuglen genmeldt fra England er den ældste i materialet, den blev mindst 10 år 11 mdr. Den ældste fugl genmeldt som levende var mærket




Fig. 3. Mærknings- og genmeldingsmåned for småspove ringmærket på Færøerne. Month of ringing (green circles) and recovery (red squares) of whimbrels ringed in the Faroes.




Fig. 4. Mærknings- og genmeldingsår for småspove ringmærket på Færøerne, i femårsperioder. Year of ringing (green bars) and recovery (red squares) of whimbrels ringed in the Faroes (five-year periods).

som unge 22. juni 1985 i Sandvík, Suðuroy, og blev aflæst 18. juni 1990 på mærkningsstedet.

### English summary

Whimbrel is a common breeding bird in the Faroes with 2,000 pairs. 350 whimbrels have been ringed in the Faroes. 92% of these were ringed as chicks. There are eight recoveries, two of them from abroad. All recoveries in the Faroes are from June-August. The two foreign recoveries are presumably from spring and autumn migration, respectively. One, ringed as a chick on 23 June 1994 in Søltuvík, Sandoy, was shot on 12 September 1996 in Guinea-Bissau, 5,581 km S of the ringing site. The other, ringed as an adult on 16 June 1994 in Akraberg, Suðuroy, was found dead on 31 May 2004 in Fowey, England, 1,237 S of the ringing site.