

Rødstrubet lom

Gavia stellata
Lómur
Red-throated diver




Rødstrubet lom har en cirkumpolar yngle-udbredelse i de nordlige dele af Europa, Rusland og Nordamerika, inklusive Grønland. I Europa yngler arten på Island, i Skotland, i store dele af Norge, Sverige, Finland samt nordlige Rusland. Rødstrubet lom overvintrer langs vesteuropæiske kyster, især er Nordsøen og Kattegat vigtige områder. På Færøerne er rødstrubet lom en fåtallig ynglefugl med en bestand på omkring 25 par. Arten er endvidere

en fåtallig træk- og vintergæst ved Færøerne. Rødstrubet lom er totalfredet på Færøerne.

Der er ikke ringmærket rødstrubet lom på Færøerne. En unge ringmærket 14. juli 1999 ved Krákuvatn på Island blev skudt 6. januar 2000 på Borðoy, 743 km østsydøst for mærkningsstedet.

Formentlig passerer rødstrubede lommer fra Grønland forbi Færøerne under efterårs- og forårstrækket, da både vest- og østgrønlandske ringmærkede fugle er genfundet ved kysterne i Vesteuropa (Lyngs 2003).



English summary

Red-throated diver is a rare breeding bird in the Faroes with approximately 25 pairs. Red-throated diver has not been ringed in the Faroes. A chick ringed on 14 July 1999 at Krákuvatn, Iceland was shot on 6 January 2000 on Borðoy, 743 km ESE of the ringing site.

Fig. 1. Mærknings- og genfundningslokalitet for rødstrubet lom ringmærket i udlandet og genmeldt på Færøerne (n=1). Linjen angiver direkte træk. *Ringing and recovery sites of red-throated divers ringed abroad and recovered in the Faroes (n=1). The line indicates direct migration.*