

Almindelig ryle

Calidris alpina

Fjallmurra

Dunlin



Almindelig ryle har en cirkumpolar yngle-udbredelse i de arktiske områder, inklusive Østgrønland, Island og Skandinavien. I Europa yngler arten desuden mod syd til det sydlige England og nordlige Tyskland. På Færøerne findes en mindre ynglebestand på 10-15 par. Endvidere er arten en almindelig trækgæst og sjælden vintergæst på øerne. Almindelig ryle overvintrer ved tempererede og subtropi-

ske kyster, bl.a. i Vesteuropa, Middelhavet og Vestafrika.

Seks almindelige ryler er ringmærket på Færøerne, fordelt på to lokaliteter, Mykines (3) og Søltuvík, Sandoy (3) (fig. 2). Første gang almindelig ryle mærkedes på Færøerne var i 1970 (3), de øvrige var i 1993 (2) og 2002 (1) (fig. 4). Fuglene er alle ringmærket i sensommeren (juli-august) og var sandsynligvis lokale ynglefugle. De tidligste fugle er mærket 29. juli og de seneste 22. august (fig. 3). Alle seks fugle blev bestemt til 1k fugle ved mærkningen, og ingen af fuglene er blevet kønsbestemt.

En af de seks almindelige ryler er genmeldt. Den var ringmærket 29. juli 1970 på Mykines og blev skudt 18 dage senere i Douro Lit, Portugal, 2.331 km syd for mærkningsstedet, svarende til en gennemsnitlig træk hastighed på 130 km/døgn (fig. 1).




Fig. 1. Samtlige genfund af almindelig ryle ringmærket på Færøerne (n=1), og mærkningslokaliteter for almindelig ryle ringmærket i udlandet og genmeldt på Færøerne (n=3). Fuldt optrukket linje angiver direkte træk, mens stiplede linjer forbinder mærknings- og genfindssted. All recoveries of dunlins ringed in the Faroes (n=1), and ringing sites of dunlins ringed abroad and recovered in the Faroes (n=3). The unbroken line indicates direct migration and dashed lines connect ringing and recovery sites.

Fakta Facts

Mærkninger *Birds ringed* 6
- heraf mærket som unger *Ringed as chicks* 0

Genmeldinger *Recoveries*
Antal genmeldinger *No. of recoveries* 1
- heraf udenfor Færøerne *Recovered abroad* 1
Antal fugle *No. of individuals* 1
- heraf mærket som unger *Ringed as chicks* 0
Genmeldingsandel *Proportion recovered* 16,7%
Mærket i udlandet og genmeldt på Færøerne
Ringed abroad, recovered in the Faroes 3

Ekstremer *Extremes*
Længste afstand *Longest distance*
Portugal Portugal 2.331 km

Tre almindelige ryler ringmærket i udlandet er gennemdt på Færøerne, to fra Storbritannien og en fra Frankrig (fig. 2). Den ene var mærket som ungfugl 30. august 1980 i Cornwall, England og blev fundet død 7. juni 1981 på Mykines, 1.295 km nordnordvest for mærkningsstedet. Den anden britiske fugl var mærket som voksen 18. august 1993 ved Solway Firth, Skotland, og blev fundet på et skib 1. juni 1995 cirka 170 sømil vestsydvest for Suðuroy, 807 km nordvest for mærkningsstedet. Den franskmærkede fugl, mærket som voksen hun 9. maj 1986 i Yves, Frankrig, blev fundet død 27. maj 1991 på Eiði, Eysturoy, 1.850 km nordnordvest for mærkningsstedet.




Fig. 2. Mærkningslokaliteter for almindelig ryle ringmærket på Færøerne (n=6). Ringing sites of dunlins ringed in the Faroes (n=6).




Fig. 3. Mærknings- og genmeldingsmåned for almindelig ryle ringmærket på Færøerne. Month of ringing (green circles) and recovery (red squares) of dunlins ringed in the Faroes.




Fig. 4. Mærknings- og genmeldingsår for almindelig ryle ringmærket på Færøerne, i femårsperioder. Year of ringing (green bars) and recovery (red squares) of dunlins ringed in the Faroes (five-year periods).

English summary

Dunlin is a rare breeding bird in the Faroes with only 10-15 pairs. It is common during migration and a rare winter visitor. Six dunlins have been ringed in the Faroes: three on Mykines and three in Søltuvík, Sandoy, all in July-August in their 1st calendar year. The only recovery is a

dunlin, ringed 29 July 1970 on Mykines, that was shot 18 days later in Douro Lit, Portugal, 2,331 km S of the ringing site (average minimum speed 130 km/day). Three foreign-ringed dunlins have been recovered in the Faroes, two from Britain and one from France.