

Stor kobbersneppe

Limosa limosa

Reyðspógvi

Black-tailed godwit



Den store kobbersneppe er udbredt som ynglefugl fra Island, Storbritannien og Frankrig, gennem Rusland til Stillehavet. *L. l. islandica* yngler på Island og sporadisk på Færøerne, i Skotland og nordlige Norge, mens *L. l. limosa* yngler i England, Vest- og Centraleuropa samt i vestlige Rusland. På Færøerne er stor kobbersneppe en sjælden ynglefugl med en lille, men stabil bestand på 1-3 par. Endvidere er arten en fåtallig trækgæst. De europæiske store kobbersnepper overvintrer primært i Sahelzonen syd for Sahara, men også i Vest- og Sydeuropa, hvor vinterbestanden sandsynligvis domineres af den islandske underart.

I alt er fire store kobbersnepper ringmærket på Færøerne, tre 2. juli 1995 ved Søltuvík på Sandoy (alle af underarten *L. l. islandica*) og én 5. september 2006 ved Sandur på Sandoy. To var mærket som unger, en som ungfugl (1k) og en som voksen.

Der findes ingen genmeldinger af store kobbersnepper mærket på Færøerne. To store kobbersnepper farvemærket i udlandet er genmeldt på Færøerne (fig. 1): En voksen fugl, mærket 3. maj 2003 ved Álftafjörður i det østlige Island, blev efterfølgende vinter aflæst i Nordirland

og siden, 29. marts 2004, i Rogaland i det sydvestlige Norge; 42 dage senere (9. juni) sås den i Vestmanna på Streymoy, og ni dage senere (18. juni) i Dee Estuary i det nordvestlige England. En anden islandsk stor kobbersneppe, mærket som voksen 21. juni 2003 ved Holt, Önundarfirði, Nordvestisland, blev aflæst flere gange i Nordvestisland, sidste gang 23. august 2004, før den aflæstes ved Sandur på Sandoy 29-30. august 2004. Samme fugl blev i 2005 aflæst på Island, i Portugal og Irland.

Trækforhold for den lille færøske ynglebestand er fortsat ukendt. Store kobbersnepper, der gæster Færøerne, er sandsynligvis islandske fugle.

Fakta Facts

Mærkninger *Birds ringed* 4
- heraf mærket som unger *Ringed as chicks* 2 (50%)

Genmeldinger *Recoveries*
Antal genmeldinger *No. of recoveries* 0
Genmeldingsandel *Proportion recovered* 0%
Mærket i udlandet og genmeldt på Færøerne
Ringed abroad, recovered in the Faroes 2




Fig. 1. Mærknings- og genfundslokalitet for stor kobbersneppe ringmærket i udlandet og genmeldt på Færøerne (n=2). Stiplede linjer forbinder mærknings- og genfundssted. Ringing and recovery sites of black-tailed godwits ringed abroad and recovered in the Faroes (n=2). Dashed lines connect ringing and recovery sites.

English summary

Black-tailed godwit is a rare breeding bird in the Faroes, with 1-3 breeding pairs. Four birds have been ringed, all on Sandoy. None of the black-tailed godwit ringed in the Faroes have been recovered. A bird colour-ringed 3 May 2003 in Álftafjörður in eastern Iceland, was seen in Northern Ireland in the following winter and spring, and was later seen 29 March 2004 in southern Norway and on 9 June 2004 in Vestmanna, Streymoy. After nine days it was seen in Dee Estuary, northwest England. Another black-tailed godwit ringed on 21 June 2004 in Holt, northwest Iceland was seen on 29-30 August 2004 in Sandur, Sandoy. Since then it was seen in 2005 in Iceland, Portugal and Ireland.