

Hvidvinget måge

Larus glaucoides
Lítill valmási
Iceland gull



Hvidvinget måges yngleudbredelse er begrænset til det nordøstlig Canada og Grønland. Arten overvintrer i det nordøstlige Nordamerika samt ved Grønland, Island, De Britiske Øer og Norge. På Færøerne er hvidvinget måge en fåtallig træk- og vintergæst, og en meget fåtallig sommergæst. Der bliver jævnligt set hvidvingede måger med karakterer svarende til underarten *L. g. kumlieni* fra Nordøstcanada (Fjeldså & Jensen 1985).

Hvidvinget måge er ikke ringmærket på Færøerne. En hvidvinget måge mærket 31. juli 1954 ved Nordre Strømfjord, Vestgrønland, blev fundet død 4. december samme år i Trongisvágur på Suðuroy, 2.230 km østsydøst for mærkningsstedet.

English summary

Iceland gull is an uncommon visitor during migration and winter in the Faroes, and rare during summer. No Iceland gulls have been ringed in the Faroes. One ringed 31 July 1954 in Northern Strømfjord, West Greenland, was found dead on 4 December 1954 in Trongisvágur, Suðuroy, 2,230 km ESE of the ringing site.




Fig. 1. Mærknings- og genfundlokalitet for hvidvinget måge ringmærket i udlandet og genmeldt på Færøerne (n=1). Linjen angiver direkte træk. Ringing and recovery sites of Iceland gulls ringed abroad and recovered in the Faroes (n=1). The line indicates direct migration.