

Polarlomvie

Uria lomvia

Íslandslomviga

Thick-billed murre



Polarlomvie yngler på fuglefjelde ved kysterne i de nordligste egne af Atlanterhavet og Stillehavet. Arten yngler mere nordligt end lomvie. I Nordatlanten yngler Polarlomvie talrigt langs østkysten af Canada, på Grønland, Island, Svalbard og i den russiske del af Barentshavet. Endvidere yngler arten i mindre udstrækning langs Nordnorges kyster. Den nordatlantiske bestand er vurderet til 10-15 millioner par. På Færøerne er polarlomvie en fåtallig vintergæst og en sjælden sommergæst, som typisk er fundet i forbindelse med jagt.

Polarlomvie er ikke ringmærket på Færøerne. En polarlomvie, mærket 10. august 1968 som unge på Kippaku, Upernavik distrikt, Grønland, blev skudt 23. december 1981 i farvandet mellem Nólsoy og Eysturoy, 2.351 km østsydøst for mærkningslokaliteten.

Store dele af den nordatlantiske bestand overvintrer ud for Sydvestgrønland og Newfoundland (Bakken m.fl. 2003, Lyngs 2003, Gaston m.fl. 2008).




Fig. 1. Mærkningslokaliteter for polarlomvie ringmærket i udlandet og genmeldt på Færøerne (n=1). Linje forbinder mærknings- og genfundlokalitet. Ringing sites of thick-billed murre ringed abroad and recovered in the Faroes (n=1). The line connects ringing and recovery sites.

English summary

Thick-billed murre is an uncommon winter visitor and a rare summer visitor in the Faroes. Thick-billed murre has not been ringed in the Faroes. A nestling ringed 10 August 1968 at Kipako, Upernavik district, Greenland, was shot 23 December 1981 at sea between Nólsoy and Eysturoy, 2,351 km east-southeast of the ringing site.