

Engpiber

Anthus pratensis

Títlingur

Meadow pipit



Engpiberen yngler i store dele af Nord- og Mellemeuropa, inklusive på De Britiske Øer, Færøerne, Island og Østgrønland. På Færøerne er engpiber en almindelig ynglefugl med en bestand på 500-2.000 par. Fugle fra de nordlige bestande, inklusive Norge, Island og Grønland er trækfugle, og engpiber er en almindelig trækgæst på Færøerne.

240 engpibere er ringmærket på Færøerne fordelt på 10 lokaliteter (fig. 2), flest på Søltuvík,




Fig. 1. Mærknings- og genfundlokalitet for engpiber ringmærket i udlandet og genmeldt på Færøerne (n=2). Fuldt optrukket linje angiver direkte træk og stiplede linje forbinder mærknings- og genfundsted. Ringing and recovery sites of meadow pipits ringed abroad and recovered in the Faroes (n=2). The unbroken line indicates direct migration and the dashed line connects ringing and recovery sites.

Sandoy (76) og Sumba, Suðuroy (71). 41 fugle er mærket på en ikke nærmere angivet lokalitet. Arten er ringmærket første gang i 1924 (Bøur og Gásadalur, Vágar), og flest er mærket i 2004 (113) og 2006 (17) (fig. 4). Fuglene er mærket mellem 16. april og 15. oktober, bortset fra en enkelt i januar. 11 er mærket om foråret (april-maj), 29 i yngleperioden (juni-juli) og 161 om efteråret (august-oktober) (fig. 3). Tre fugle ringmærket på et skib 133 sømil vest for Suðuroy 8. september 1939 er ikke vist på fig. 2. Blandt de kønsbestemte fugle (n=87) er 13% angivet som hunner og 87% som hanner. Blandt aldersbestemte fugle (n=216) er 25% unger, 61% ungfugle (1k) og 13% ældre fugle (2k+).

Ingen af de færøsk-mærkede engpibere er genmeldt. En engpiber mærket 13. oktober 1955 som voksen i Hertfordshire, England, er genmeldt død 7. maj 1956 i Porkeri, Suðuroy, 1.169 km nordnordvest for mærkningsstedet (fig. 1). En islandsk engpiber mærket 13. august

Fakta Facts

Mærkninger Birds ringed 240
- heraf mærket som unger Ringed as chicks 55 (23%)

Genmeldinger Recoveries
Antal genmeldinger No. of recoveries 0
Genmeldingsandel Proportion recovered 0%
Mærket i udlandet og genmeldt på Færøerne Ringed abroad, recovered in the Faroes 2

2006 som ung på Einarsslundur, Hornafjørður, er fundet død 25. september 2006 om bord på et skib ved Islandsryggen, 55 sømil nordvest for Færøerne, cirka 350 km østsydøst for mærkningsstedet.

Engpibere ringmærket på Island er om efteråret og vinteren genfundet i Frankrig og på Den Iberiske Halvø (Zink 1975). Norske fugle trækker til samme område (Bakken m.fl. 2006).




Fig. 2. Mærkningslokaliteter for engpiber ringmærket på Færøerne (n=199). *Ringling sites of meadow pipits ringed in the Faroes (n=199).*




Fig. 3. Mærkningsmåned for engpiber ringmærket på Færøerne. *Month of ringling of meadow pipits ringed in the Faroes.*




Fig. 4. Mærkningsår for engpiber ringmærket på Færøerne, i femårsperioder. *Year of ringling of meadow pipits ringed in the Faroes (five-year periods).*

English summary

The meadow pipit is a common migratory breeder in the Faroes with a population of 500-2,000 pairs. 240 birds have been ringed, most in Søltuvík, Sandoy (76) and Sumba, Suðuroy (71). The first meadow pipit was ringed in Bøur and Gásadalur, Vágar, in 1924, and the largest numbers were ringed in 2004 (113) and 2006 (17). Meadow pipits have been ringed during spring (11), the breeding season (67) and autumn (161). No meadow pipits ringed in the

Faroes has been recovered. A bird ringed as an adult on 13 October 1955 in Hertfordshire was found dead on 7 May 1956 in Porkeri, Suðuroy, 1169 km NNW of the ringling site. A meadow pipit ringed as a first-year bird on 13 August 2006 on Einarsslundur, Hornafjørður, Iceland was found dead on 25 September 2006 on a ship at the Iceland-Faroe Ridge, approximately 350 km ESE of the ringling site.