

Silkehale

Bombycilla garrulus

Reydstapi

Waxwing



Silkehale yngler i de nordlige egne af Skandinavien og Finland samt østpå gennem Rusland til Stillehavet. Arten findes desuden i Nordamerika. En del af de europæiske fugle forlader yngleområderne om efteråret og kan optræde invasionsagtigt i Nord- og Centraleuropa, inklusive De Britiske Øer. På Færøerne er silkehale en ret almindelig træk- og

vintergæst, særlig i forbindelse med invasioner, samt en sjælden sommergæst.

Silkehale er ikke ringmærket på Færøerne. En voksen hun, ringmærket 7. november 2004 i Hareid nær Ålesund i Vestnorge, blev fundet død 15. marts 2005 nær Kvivik, Streymoy, 682 km vest for mærkningslokaliteten.

Silkehaler der gæster Færøerne er formentlig nordeuropæiske fugle.




Fig. 1. Mærkningslokaliteter for silkehale ringmærket i udlandet og genmeldt på Færøerne (n=1). Linjen angiver direkte træk. *Ringing sites of waxwings ringed abroad and recovered in the Faroes (n=1). The line indicates direct migration.*

English summary

Waxwing is a common but irregular visitor in the Faroes, primarily seen in connection with irruptions. No waxwing has been ringed in the Faroes. An adult female, ringed 7 November 2004 at Hareid near Ålesund in W Norway, was found dead 15 March 2005 near Kvivik, Streymoy, 682 km W of the ringing site.